
Centaurea erdneri × C. oxylepis

Rozšíření



Habitus a typ růstu

Výška [m]: **0,3–1**

List

Přítomnost a přeměna listu: **listy přítomny, nejsou přeměněné**
Palisty: **chybějí**
Řapík: **přítomen i chybí**

Květ

Doba kvetení [měsíc]: **červenec–srpen**
Barva květu: **růžovofialová**
Květní obaly: **kalich redukovaný, koruna přítomna**
Srůst kalicha: **chmýr**
Typ květenství: **chocholičnatá lata úborů**

Způsob výživy

Parazitismus a mykoheterotrofie: **autotrofní**
Masožravost: **rostlina není masožravá**
Symbiotická fixace dusíku: **bez symbiontů fixujících dusík**

© 2014–2026 Pladias – Citace: Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz

Původ taxonu

Původnost v ČR: **původní**

Stanoviště a sociologie

Vazba na lesní prostředí

Vazba na lesní prostředí v termofytiku: **0 – taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**
Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: **0 – taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**

Rozšíření a hojnost

Výškový stupeň v ČR: **nížiny, pahorkatiny, podhůří**
Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 129
taxon.data.freq_in_quad: 268

© 2014–2026 Pladias – Citace: Pladias – databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz